

О

ВРАЧЕБНЫХЪ СВОЙСТВАХЪ •

БЕБИРИНА.

• Douglas'a Maclagan'a, изъ «Edinburg Medical
and Surgical Journal. April, 1845».

«Edinburg Medical and Surgical Journal»
April, 1845, No. 2, 1845.

*Prepared by J. F. Macfarlane Esq
of Bristol*

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

—
1845.

Изъ Военно-Медицинскаго Журнала,
Часть XLV, No. 3, 1845.

R38319

Въ Апрѣлѣ 1843 года Dr. MacLagan сооб-
щилъ Единбургскому Королевскому обществу свои
наблюдения касательно химическихъ и фармацев-
тическихъ свойствъ растенія, получаемого изъ
Британской Гвіаны, называемаго *Bebeeru* или
greenheart tree, въ которомъ D. Rodie, (въ Гвіанѣ),
открылъ присутствіе растительной щелочи и по-
мученный имъ алколоидъ, который онъ назвалъ
Bebeerine, обладаетъ, по его мнѣнію, противули-
хорадочными дѣйствіями (*virtus antiperiodica*).

Въ Августѣ того же года Dr. MacLagan по-
мѣстилъ статью въ Cornack's monthly Journal о
врачебныхъ свойствахъ *bebeerin'a*, гдѣ онъ описы-
ваетъ нѣсколько случаевъ, изъ собственной прак-
тики и сообщенныхъ ему другими, доказываю-
щихъ противулихорадочное и тоническое свойство
bebeerina, сходное съ хинною солью въ общихъ
дѣйствіяхъ, съ тѣмъ различіемъ, что *beberin*
не возбуждаетъ кровеносной системы и не произ-
водитъ общаго раздраженія въ организмѣ.

«Намѣреніе мое,» говоритъ Dr. MacLagan,
«представить медицинскому сословію новыя дока-
зательства цѣлебныхъ свойствъ этого вещества,

чтобы оно могло войти въ общее употребленіе вмѣсто хинина, если только дальнѣйшіе опыты оправдаютъ его дѣйствительность.»

«Не говоря о частныхъ случаяхъ, доказывающихъ цѣлебное дѣйствіе бебирина, я считаю не излишнимъ сообщить напередъ нѣкоторыя свѣденія, касательно естественной исторіи растенія и его фармацевтическихъ свойствъ, полученные мною въ послѣдствіи.»

«Въ отчетѣ, представленномъ Королевскому обществу, я говорилъ, что растеніе это мнѣ было извѣстно и хотя оно причислено Hooker'омъ, Lindley'мъ и Schomburgk'омъ къ естественному разряду Lauraceae, по ничега положительнаго объ немъ не было извѣстно. Послѣ того я получилъ отъ Dr. Wath'a изъ Demerara экземпляры этого растенія въ цвѣту; D. Schomburgk разсмотрѣвъ ихъ, подтвердилъ естественное мѣсто ихъ въ разрядѣ Lauraceae, родъ—Nectandriae и далъ имъ видовое названіе N. Rodiei, въ честь Dr. Rodie, открывшаго лечебныя его качества.»

«Касательно химическихъ свѣденій дѣйствующаго начала въ этомъ растеніи, многіе опыты убѣдили меня, что почитаемый мною второй алкалоидъ, подъ названіемъ Sipeerine, ни что иное, какъ продуктъ окисленія бебирина, и что въ корѣ растенія содержится одинъ только алкалоидъ—bebeerine. Другія мои занятія помѣшали

мнѣ окончательно изслѣдовать его химическія составныя части, вмѣстѣ съ Профессоромъ Til-
ley въ Бирмингамѣ; но я надѣюсь скоро полу-
чить результаты изслѣдованія его въ Гисенской
лабораторіи отъ Профессора Liebig'a, которому
я послалъ сѣрнокислую соль этого алкалоида.»

«Особенно важно для насъ то, что въ приго-
товленіи этого средства для врачебнаго употреб-
ленія сдѣланы большія усовершенствованія, и я
не могу умолчать о неусыпныхъ трудахъ Г.
J. F. Macfarlane'a и его лаборанта Г. Brown'a
касательно усовершенствованія качества и нару-
жнаго вида этой соли; послѣдніе образцы этой
соли доказываютъ вполне успѣхъ химическихъ
занятій этихъ ученыхъ.»

Главное обстоятельство, почему соль послѣд-
няго приготовленія имѣетъ преимущество предъ
прежнею, состоитъ въ томъ, что въ ней удер-
жано нѣсколько больше основаніе, отъ чего она
не такъ легко разлагается при высушкѣ, какъ
средняя или совершенно нейтральная соль. Та-
кая соль, подобно *disulphati chinini*, требуетъ
только прибавленія нѣсколькихъ капель сѣрной
кислоты для совершеннаго своего растворенія.

Сравнивая эту соль съ совершенною нейтраль-
ною, оказывается, что составныя части въ обѣ-
ихъ соляхъ, тщательно высушенныхъ, находятся
въ слѣдующей пропорціи: въ первой соли беби-

рина 86,39 и сѣрн. кисл. 13,61; въ послѣдней
бесирина 90,83, кисл. 9,17.

Объ соли безводны. Приготовленная Macfarlane'омъ (которую я получилъ въ бумагѣ, вмѣсто
стеклянки съ притертой пробкой), содержала 0,11°
гигрометрической влажности. Г. Macfarlane по-
лагаетъ, что препаратъ этотъ можно имѣть за
6 шиллинговъ унцію, что составляетъ менѣе по-
ловины цѣны хинной соли, которой унція сто-
итъ $12\frac{1}{2}$ шиллинговъ.

Въ Майскихъ книжкахъ Журнала «The Lancet»
1845, о сравнительной цѣнѣ этихъ двухъ ве-
ществъ также сказано, что сѣрнокислая соль
бесирина, приготовляемая Единбургскимъ Хими-
комъ Г. Macfarlane'омъ, лучшей доброты,
стоитъ 6 шиллинговъ (2 руб. сер.) $\frac{7}{8}$, между-
тѣмъ-какъ хинная соль стоитъ слишкомъ 12 шилл.
 $\frac{5}{8}$ (4 руб. 15 коп. сер.). Касательно врачебнаго
дѣйствія бесирина этотъ журналъ говоритъ, что
сорокъ примѣровъ, приведенныхъ въ доказа-
тельство его благотворныхъ дѣйствій, достаточ-
но убѣждаютъ, что бесиринъ въ одинаковыхъ
пріемахъ съ хинною солью равное ей оказываетъ
дѣйствіе на болѣзнь; но въ нѣкоторыхъ случа-
яхъ замѣчено, что онъ не производитъ, подобно
хинину, непріятныхъ послѣдствій, какъ-то при-
ливовъ крови къ головѣ и проч. Вещество это
безъ всякаго сомнѣнія по своей дешевизнѣ и

драгоценнымъ дѣйствіямъ заслуживаетъ вниманія врачей особенно тѣхъ, которые часто имѣютъ дѣло съ перемежающеюся лихорадкой.

«Весьма замѣчательно, «говоритъ Dr. Th. George Tilley, «что бебиринъ, которой обладаетъ такими явными противулихорадочными свойствами, въ пропорціи атомовъ по своему составу почти равенъ съ морфіемъ, чистымъ оглушающимъ средствомъ.»

Бебиринъ нынѣ готовится для продажи Г. Macfarlane'омъ въ Единбургѣ; изъ сѣрно-окислой соли, имъ приготовленной, также можно получить чистое основаніе; для сего изъ раствора сѣрнокислой соли въ водѣ основаніе осаждается амміакомъ, осадокъ смѣшивается со вновь осажденнымъ воднымъ окисломъ свинца и прибавляется достаточное количество воды для составленія тѣста, которое потомъ высушивается и распускается въ чистомъ алкоголѣ. Бебиринъ въ алкоголѣ растворяется, но онъ еще не совершенно чистъ; полученный чрезъ выпариваніе спиртнаго раствора бебиринъ растворяется въ эфирѣ и снова выпаривается. Приготовленный такимъ образомъ въ чистомъ видѣ бебиринъ, если

обжигать съ окисью мѣди, то формула его будетъ слѣдующая:

по опыту найдено.	{	C. 72.21 . . 35 . . 72.11	}	по разни- сленію.
		H. 6.62 . . 40 . . 6.77		
		N. 4.30 . . 2 . . 4.82		
		O. 17.02 . . 6 . . 16.30		

Такимъ образомъ формула бебрина равна формулѣ морфія, и атомическій вѣсъ ея также равенъ атомическому вѣсу послѣдняго. Числа, найденныя нами для атомическаго вѣса платиннаго состава бебрина = 6330.2; а такого же состава морфія (по исчисленію) = 6255.7; разительное сходство между двумя тѣлами по вѣсу ихъ атомовъ.

Изъ этого можно вывести заключеніе, что число и свойство элементовъ, изъ которыхъ состояются органическія тѣла, не могутъ служить поясненіемъ фізіологическаго ихъ дѣйствія на организмъ; въ этомъ случаѣ разница дѣйствія явно зависитъ отъ одного расположенія ихъ атомовъ.

«Касательно лечебной силы бебрина,» говоритъ D. MacLagan, «я на первый разъ ограничиваюсь свидѣтельствами о его достоинствахъ, сообщенными мнѣ изъ разныхъ мѣстъ, и доволенъ

тѣмъ, что до сихъ поръ я не встрѣтилъ ни одного случая, который могъ бы поколебать мое объ немъ мнѣніе и я увѣренъ, что бебиринъ, по его цѣлебной силѣ, какъ *remedium antiperiodicum et tonicum*, между врачебными средствами получить со временемъ перевѣсъ надъ сѣрно-кислымъ хининомъ, по дороговизнѣ послѣдняго.»

«Прежде,» говоритъ Г. MacLagan, «я сообщу случаи, доказывающіе дѣйствіе бебирина въ ослабляющихъ и перемежающихъ лихорадкахъ, съ таблицею всѣхъ случаевъ, мнѣ извѣстныхъ; а потомъ перейду къ употребленію его въ періодическихъ головныхъ боляхъ, нервныхъ страданіяхъ и проч.»

Перемежающія и послабляющія лихорадки.

D. Watt въ Georgetown'ѣ въ Demerara, котораго первыя наблюденія сообщены мною въ 1843, доставилъ ко мнѣ слѣдующія свои дальнѣйшія наблюденія.

Примѣръ 1. F. quotidiana. Josephina Pereira, урожденная изъ о. Мадеры, 38 лѣтъ, въ Demerara 4 года, съ пріѣзда своего въ эту страну имѣла часто припадки перемежающейся лихорадки. Она работаетъ на сахарныхъ план-

таціяхъ и кормить 4 мѣсячнаго, груднаго младенца.

27-го Ноября 1843. Она получила лихорадку 24-го числа въ 10 часу утромъ, которая возвращалась ежедневно въ томъ же часу, со рвотой. Прописано. colomet et jalap. Желчи со рвотою сегодня не было; языкъ чистъ; пульсъ 116. Назначено 12 gr. бебпрна вечеромъ и такой же пріемъ въ 6 часовъ завтра утромъ.

28-го. Лекарство вечеромъ принято, но утромъ больная не успѣла принять его по случаю пароксизма; назначено 12 gr. бебпрна вечеромъ и 12 gr. рапо по утру.

29-го. Приняты оба пріема, какъ сказано. Лихорадка сегодня въ обыкновенное время не возвращалась; больная пошла на рѣку мыть дѣтское бѣлье. Въ полдень опять лихорадка; больной велѣно сидѣть дома и принимать по 12 gr. бебпрна утромъ и вечеромъ.

1-го Декабря. Лихорадка не возвращалась ни вчера, ни сегодня; всего принята 3j бебпрна; больная не чувствовала ни шума въ ушахъ ни въ головѣ, ни глухоты. Съ тѣхъ поръ лихорадки не было.

Примірѣ. II. F. tertiana. Maria de Jesus изъ

о. Мадеры, 4 года въ колоніяхъ, страдаетъ по временамъ перемежающеюся лихорадкой, которая возвращается обыкновенно черезъ день.

29-го Декабря 1843. Третьяго дня имѣла пароксизмъ перемежающейся лихорадки и другой сегодня. Во время озноба вышло съ рвотою много желчи; пульсъ 120; кожа горяча и суха, назначено тотчасъ gr. x. colomet. съ xxv gr. jalap. и потомъ 12 гранъ бебпрна на ночь; на другой день по 12 гранъ бебпрна утромъ и вечеромъ.

31-го. Больная приняла лекарство, какъ сказано; тридцать шесть гранъ бебпрна не оказали никакого вліянія на голову. Какъ сегодня день лихорадочный, то назначено опять принять тотчасъ 12 гранъ бебпрна.

Лихорадка съ тѣхъ поръ болѣе не возвращается.

Прилипы III. Hypertrophia lienis et febris.
José da Brío, изъ о. Мадеры, около 3 лѣтъ въ колоніи; часто страдалъ перемежающимися лихорадками; лице истощенное, блѣдное, селезенка чрезвычайно велика и простирается внизъ до праваго подвздоха.

3-го Генваря 1844. Въ 5 часовъ пополудни, третьяго дня, былъ лихорадочный пароксизмъ,

который продолжался всю ночь; утромъ вчера прервался, но опять возвратился въ 5 часовъ вечера и продолжался во всю ночь. Кожа (10 ч. утра) влажная; пульсъ 90, малъ и мягокъ; языкъ пестрый; желудокъ раздраженъ; назначено тотчасъ рвотное и salomel. gr. x на ночь; завтра утромъ Jalap. xxv gr.

5-го Генваря. Принялъ рвотное; но какъ лихорадка только перемѣжалась и къ вечеру 3-го числа возвратилась съ большею силою, то больной не принялъ ни каломели, ни ялапы. Вчера была перемѣжка до полдня, но къ вечеру опять пароксизмъ. Сегодня также перемѣжка къ утру; въ 1 часу по полудни кожа горяча и суха, пульсъ 116. Назначено opii gr. vj; tartari emetici gr. j; salomel. gr. x. M. et divide in IV pilul. Одну пилюлю каждые 6 часовъ, пока продолжается лихорадка.

6-го Генваря. Лихорадка продолжается въ одинаковой силѣ, кожа иногда влажна, иногда суха, всегда горяча; больной жалуется на боль при прижатіи селезенки. Назначенъ парывной пластырь на селезенку; остальную пилюлю принимать теперь, а два часа послѣ — jalap. 3j, и къ ночи 12 гранъ бебериша.

7-го. Лихорадка продолжалась вчера до вечера, больной не позволилъ поставить мушку, но принималъ всѣ лекарства; вышло много желчи. Назначены 12 гранъ бербурна два раза въ день.

8-го. Лихорадка не возвращалась. Приняты только два приема бербурна вчера и третій сего дня рано утромъ. Больной спалъ не много ночью, чувствуетъ себя лучше, но очень слабъ. Назначены 12 гранъ бербурна въ полдень; позволено не много вина и супу.

10-го. Лихорадки небыло; языкъ очищается; селезенка мягче, меньше и не чувствительна, назначено *jalap. xxxv gr. и ʒj cremor. tartari*. Принятое количество бербурна не оказало никакого вліянія на голову, больной выздоровѣлъ.

Примѣръ IV. Julio de—, изъ о. Мадеры, 12 лѣтъ, страдалъ *febris congestiva* въ Августѣ и былъ въ безчувствіи два дня.

Въ Генварѣ 1844. Имѣлъ недавно *febrem tertianam*; получалъ бербурнъ въ тѣхъ же приемахъ, какъ дается хининъ и лихорадка совершенно прошла. Замѣчанія и подробности этого случая не извѣстны.

Примѣръ V. *F. intermitt. biliosa.* G. William C., уроженецъ изъ Шотландіи, 20 лѣтъ, около

четырехъ лѣтъ въ колоніи въ качествѣ надзира-
теля полевыхъ работъ, и потому постоянно под-
верженъ солнечному жару и непогодѣ, два года
назадъ страдалъ желтою горячкою, въ сильной
степени; но съ тѣхъ поръ совершенно здоровъ.

Апрѣля 15-го. Около половины 11 часа сего-
дня вдругъ на полѣ почувствовалъ лихорадку, съ
желчною рвотой, но безъ явнаго озноба; въ 3
часа пополудни сильно потѣлъ; пульсъ 120, пол-
ный; жестокая боль надъ лбомъ, моча сильно
окрашена желчью; языкъ покрытъ корою. Наз-
начены 4 пилюли *ex massa colocynth. gr. xvj*, *calo-*
mel. gr. xij и на утро полный приемъ *sulphatis*
magnesiae.

16-го. Утромъ ни лихорадки, ни головной боли
не было; испражненія сначала темно-зеленныя,
послѣ желтыя; моча очень красная; лекарства
еще дѣйствуютъ.

17-го. Вчера въ три часа по полудни лихорад-
ка возвратилась безъ явнаго озноба; данъ опять
приемъ *sulph. magnesiae*; испражненія очень
желчны, моча такая же. Въ 11 часовъ утромъ
лихорадочный пароксизмъ продолжался почти
часъ; въ это время съ рвотою вышло много
желтой желчи. Въ 1 часу кожа горяча и суха;

пульсъ 120, полный; жестокая головная боль во лбу. Назначено примачивать голову чаще уксусомъ съ водою и надъ бровями мокрыя ветошки. Внутрь :

Rp. Sulph. bebeer. \mathfrak{z} jj et gr. vjjj ; calomel.
gr. xxjv. Mucilag. g. arabic. q. s. ut. ft.
massa, in pilul. xij dividenda, Sr.

принять три пилюли, спустя два часа послѣ лихорадки, три вечеромъ и три завтра утромъ.

18-го. Вчера потъ начался въ четыре часа, лихорадка прошла часовъ въ 7 по полудни. Больной принялъ, какъ предписано, всѣ 9 пилюль ; ночью спалъ хорошо; боли и тяжести въ головѣ не было, равно какъ и звону въ ушахъ, языкъ нечистъ; отъ пилюль три раза слабло, моча не такъ темна. Назначено 45 gr. jalap. cum cremore tartari.

19-го, 7 часовъ утра. Лихорадки не было; слабительное мало дѣйствовало, отъ того, что спустя полчаса послѣ приему порошка, больного вырвало. Спалъ ночью спокойно, показался аппетитъ, пульсъ 80, патуральный; языкъ еще покрытъ зеленоватою слюзою; цвѣтъ мочи темнѣе, глаза желтоваты. Назначены три пилюли изъ беберины и каломеля.

1 часть по полудни. После завтрака, изъ двухъ яицъ, чаю и поджареннаго хлѣба, больной почувствовалъ полноту и тягость въ желудкѣ, тошноту и сильное безпокойство.

5 часовъ по полудни. Скоро потомъ показалась рвота, съ которою вышли яйца и все прочее; въ 2 часа снова показалась лихорадка и вслѣдъ за тѣмъ обильная испарина. Пульсъ 84, полный; неприятное чувство полноты въ верхней части живота; глазные бѣлки желты, моча также окрашена желчью. Назначено промывательное, три пилюли изъ бебиррина и каломеля на ночь, и три на другой день утромъ.

20-го. Больной въ 24 часа принялъ 36 гранъ бебиррина. Звону въ ушахъ и глухоты небыло, равно какъ и неприятнаго чувства въ головѣ; пульсъ 80, мягкій; кожа влажная; сонъ хорошъ; промывательное осталось безъ дѣйствія и больной еще жалуется на полноту въ животѣ. Назначено *sulph. magnesiac*, по желанію самаго больного. Три пилюли бебиррина съ каломелемъ вечеромъ и три на другой день утромъ.

22-го. Кромѣ назначенныхъ лекарствъ, утромъ еще приемъ *sulph. magnesiac*; глаза и моча не такъ желты; пульсъ и кожа въ есте-

ственномъ состояніи, десны чувствительны отъ каломеля; позывъ на пищу; съ 17-го числа не было лихорадки, за исключеніемъ слабого приступа послѣ погрѣшности въ діетѣ 19-го числа.

23-го. Больной поправился и 29-го возвратился къ прежнимъ своимъ работамъ.

Мая 6-го больной былъ на полевыхъ работахъ, гдѣ отъ дождя промокъ до костей и почувствовалъ сильную боль въ головѣ. Въ полдень 7-го числа появилась лихорадка и повторялась въ тѣ же часы вчера и сегодня; приступы продолжались отъ двухъ до трехъ часовъ каждый разъ; языкъ бѣловатъ.

Rp. Mass. pilul. coloc. comp. gr. xvj;

Colomelis gr. x; M. ft. pil. No. jv. dr. sr.
на одинъ приемъ, и на утро — приемъ sulph.
magnesiae.

10-го. Пилюли и соль хорошо дѣйствовали; лихорадка возвратилась въ полдень четвертымъ, ежедневнымъ пароксизмомъ.

Rp. Sulph. bebeer. Эjj, Muc. gum. ar. q. s. ut fiat
massa, in pil. No. xjj dividenda. sr.

три пилюли на ночь, три въ 6 часовъ и три въ 10 ч. утра слѣдующаго дня.

11-го. Больной принялъ двадцать пилюль;

лихорадка появилась въ полдень ; это былъ пятый пароксизмъ. Принять три остальныхъ пилюли рано утромъ, на слѣдующій день.

13-го. Лихорадки не было ни вчера ни сегодня.

Июня 1-го больной выздоровѣлъ.

Случай VI. Докторъ F. въ Декабрѣ прошлаго года имѣлъ сочувственную лихорадку отъ нарыва, противъ которой ему совѣтовали принимать хининъ, во время перемѣжекъ, что онъ и дѣлалъ три дня сряду; но послѣ каждого пріема, часа два спустя, все тѣло его покрывалось крапивною сыпью, продолжавшеюся 6 часовъ, съ нестерпимымъ зудомъ и беспокойствомъ.

Въ Генварѣ ему опять присовѣтовали принять полные пріемы хинина (10 гранъ), предполагая что появленіе крапивной сыпи, при прежнемъ употребленіи, могло зависѣть отъ не надлежащаго качества хининой соли, приготовленной въ Филаделфіи; онъ обратился къ Французскому хинину разныхъ приуготовленій, но крапивная сыпь не переставала появляться за каждымъ пріемомъ, хотя послѣдній былъ не болѣе 6 гранъ. Это повторялось шесть или семь разъ.

4-го Феврала F. имѣя надобность въ подоб-

номъ лекарствѣ, рѣшился замѣнить его sulph. bebesicini, котораго онъ принялъ 10 гранъ, съ сахаромъ. Послѣ этого приема крапивная сыпь не показывалась и бебсипинъ оказалъ полное дѣйствіе, какое обыкновенно производилъ хининъ въ прежнихъ случаяхъ. Съ тѣхъ поръ онъ принималъ еще bebesicini въ разныхъ промежуткахъ, три раза, и всегда съ полнымъ успѣхомъ и крапивной сыпи не было никакихъ слѣдовъ. Однажды онъ принялъ 14 гранъ бебсипина въ разъ и не почувствовалъ послѣ того ни звону въ ушахъ ни въ головѣ, ни какого либо другаго непріятнаго чувства, какъ это всегда случается послѣ большихъ приемовъ хинина.

Примѣчаніе. Хининъ въ полныхъ приемахъ обыкновенно производитъ непріятныя пріпадки. Больной отъ его чувствуетъ какъ бы полноту въ головѣ, тупость въ понятіяхъ, звонъ въ ушахъ, глухоту; обнаруживается часто чувствительность во всей нервной системѣ, конечности до того иногда дрожать, что больной не можетъ держать пера въ рукахъ. Пріпадки эти въ большей или меньшей силѣ обыкновенно являются послѣ полныхъ приемовъ хинина, т. е. гранъ 20 или 30 въ сутки; а меньшимъ коли-

чествомъ едва ли можно остановить перемежающуюся лихорадку. Хининъ такъ же сильное оказываетъ вліяніе на кожу и на желчныя пути, увеличивая отдѣленіе испарины и желчи; отъ того небольшой припшекъ припятаго хинина иногда производитъ холодный потъ, упадокъ пульса и значительное раздраженіе въ желудкѣ. «Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ, которыя мнѣ случалось видѣть,» говоритъ Dr. Watt, «больные принимали хининъ безъ мѣры и потому не возможно было опредѣлить его количества; но вѣроятно все количество въ продолженіи двадцати четырехъ часовъ не превышало 40—45 гранъ. Впрочемъ въ желтой горячкѣ въ этой странѣ (въ Индіи) D. Smitt и многіе другіе врачи давали съ большимъ успѣхомъ отъ 20 до 24 гранъ хинина съ каломелемъ каждыя четыре часа, пока горячка не уступала, безъ всякихъ отъ того непріятныхъ припадковъ. Кажется, хининъ дѣйствуетъ по закону подобному кровопусканію, какъ объясняетъ Dr. Marshall Hall: чѣмъ большая потребность въ хининѣ, тѣмъ большее количество его организмъ въ состояніи выдерживать, безъ всякаго нарушенія отправленія нервной системы, и на оборотъ, чѣмъ меньше надобности

въ немъ, тѣмъ меньшее количество оказываетъ уже вліяніе. Шестъ или семь гранъ, принятыхъ внутрь для предупрежденія лихорадочнаго пароксизма, большею частью прічипятъ звонъ въ ушахъ; между-тѣмъ- какъ тройное количество потребуетъ для возбужденія такого припадка, если прінять хинина во время пароксизма.»

«Если дѣйствіе бебирина въ перемежающихся лихорадкахъ такое же, какъ и хинина, въ чемъ, кажется, нельзя уже сомнѣваться; то бебиринъ на своей сторонѣ имѣетъ уже то преимущество, что онъ не тяготитъ головы и гораздо меньше раздражаетъ нервную систему и, сколько до сихъ поръ извѣстно, вовсе не раздражаетъ желудка и не производитъ холоднаго пота. Въ случаѣ V, гдѣ Г. С., принявъ 95 гранъ бебирина въ три дня съ половиною, я бы не рѣшился» говоритъ Dr. Watt «дать столько хинина, опасаясь холоднаго пота, упадка пульса и раздраженія въ желудкѣ, тѣмъ болѣе при скопленіи желчи, когда припадки эти скорѣе являются отъ приемовъ хинина.» Dr. Watt подозреваетъ, что противулихорадочное дѣйствіе бебирина нѣсколько медлѣннѣе, какъ видно изъ примѣра 1, гдѣ лихорадка возвратилась тогда, когда при употребленіи хинина организмъ находился

бы еще подъ его вліяніемъ; также, въ примѣрѣ V, гдѣ лихорадка возвратилась, когда слѣдовало бы еще организму находиться подъ вліяніемъ бебирина; но въ обоихъ этихъ случаяхъ причина вторичной лихорадки могла зависѣть отъ самыхъ большихъ; одинъ рано вышелъ на воздухъ, другой погрѣшалъ въ діетѣ. Если дальнѣйшія наблюденія подтвердятъ это подозрѣніе въ дѣйствіи бебирина, то не объясняется ли оно тѣмъ, что хинаинъ дѣйствуетъ прямо на нервную систему, а бебиринъ посредствомъ кровеносной, и потому, быть можетъ, противулихорадочное дѣйствіе бебирина будетъ болѣе постоянное и гораздо надежнѣе? Мышьякъ, какъ извѣстно, прекращаетъ лихорадку не ранѣе 10 или 12 дней, но онъ гораздо постояннѣе въ своемъ дѣйствіи, чѣмъ хина; не можно ли ожидать подобнаго явленія отъ бебирина?

Примѣчаніе. Dr. Macfarlane замѣтилъ, что бебиринъ будучи принятъ на ночь, всегда оказываетъ слабительное дѣйствіе утромъ, что замѣтили и другіе практики, особенно въ значительномъ приѣмѣ, 12 или 15 gr., дѣйствуетъ одинъ разъ легко и безъ всякой боли. Дѣтямъ онъ давалъ его, какъ *remedium tonicum*, въ малыхъ

пріемахъ. Когда хининъ даютъ противу лихорадки въ значительныхъ пріемахъ въ промежуткахъ, то рѣдко является другой пароксизмъ послѣ такихъ пріемовъ; но послѣ бебирина часто одинъ пароксизмъ повторяется, но другаго не бываетъ; это надобно помнить, ибо много не повѣрятъ сего дѣйствительности.

Въ Августѣ 1843 года Г. MacLagan послалъ Dr. Nicolson'у, Инспектору госпиталей въ Мадраасѣ, нѣсколько унцій sulphatis bebeerini и получилъ отъ него слѣдующіе результаты опытовъ, произведенныхъ врачами, принадлежащими колоніи.

ШЕСТЬ СЛУЧАЕВЪ ЛИХОРАДОКЪ, ВЫЛЕЧЕННЫХЪ БЕБИРИНОМЪ.

Febris intermittens quotidiana. James Templeton, 25 лѣтъ, сангвиническаго темперамента, бумажно-прядильникъ, проживающій въ Индіи четыре года и три мѣсяца, 20 Ноября 1843 прибылъ въ полдень; въ два предыдущіе дни имѣлъ лихорадочный пароксизмъ въ 10 часовъ утра; ознобъ былъ непродолжительный, съ послѣдующею головною болью и сильнымъ жаромъ, но умѣреннымъ потомъ. Больному дано рвотное, потомъ

драхма pulv. r. jalappae cum infuso sennae $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$;
вечеромъ пожная ванна и черезъ 2 часа по $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$
mixt. diarrhoeal.; назначенъ легкій супъ.

21. Рвотное и слабительное хорошо дѣй-
ствовало, ночь спалъ дурно, лихорадка пѣтъ,
пульсъ спокойный, кожа мягка, языкъ чистъ,
аппетиту пѣтъ. Больному назначено Sulph.
bebeerini gr. v. cum extr. gentian. и въ
десятомъ часу такой же пріемъ во второй
разъ. Вечеромъ легонькая лихорадка въ 9 ча-
совъ; пароксизмъ неправильный; испражненіе
свободное; языкъ чистъ. Назначены еще двѣ
плюмы.

22. Сонъ хорошъ; лихорадка пѣтъ; языкъ
чистъ; пульсъ правильный. Назначено пріять
то же чело плюмы, какъ и вчера и легкая пища;
вечеромъ лихорадки не было.

23. Пароксизмъ не возвращался, лекарства
тѣже и въ тѣхъ же самыхъ пріемахъ.

24. Испражненія свободны; больной почти
здоровъ; безпринъ оставленъ; назначено три раза
въ день пріять по $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ inf. gentianae.

25. Больной выздоровѣлъ.

Febris remittens. James Barber, рядовой, 21
года, тѣлосложенія крѣпкаго, въ Индіи годъ

два мѣсяца. 24-го Ноября 1843 года, въ казармахъ почувствовалъ вдругъ болн во всемъ тѣлѣ, съ лихорадочными пррпадками; пульсъ обыкновенный; кожа жесткая; языкъ печистъ; худой аппетитъ и жажда. Назначенъ haust. emeticus, потомъ salomel gr. vj; pulv. jalap. com. ʒj; и за тѣмъ mist. diaphor. ʒj каждые два часа; теплая ванна и легкая пища.

25. Больного ослабло; послѣ ванны потѣлъ и спалъ покойно; аппетиту нѣтъ, пульсъ спокойный; кожа влажна, мягка, языкъ бѣловатъ. Назначено sulph. bebeerini gr. v. cum extr. gentian. каждые три часа, продолжая, смотря по надобности, и mist. diaphoret.

26. Лихорадки вчера не было, больной спалъ хорошо; свободно на низъ; аппетитъ поправился; пульсъ покойный; языкъ чистъ. Пилюли и діэта тѣ же, какъ и вчера.

27. Лихорадки не было; испражненія жидкія; языкъ чистъ; сонъ хорошъ. Лекарства по прежнему.

28. Больной поправляется; назначено infus. gentianae.

29. Тоже.

30. Больной выздоровѣлъ.

Febris remittens. James Axford, рядовой, 23 лѣтъ, полнокровнаго сложенія, въ Индіи четыре года. 27-го Ноября 1843 года, жаловался на лихорадку, начавшуюся вчера вечеромъ; онъ спалъ на сквозномъ вѣтрѣ въ казармахъ. Общее состояніе здоровья хорошее; послѣдній разъ былъ боленъ поносомъ въ Іюль 1842. Пульсъ полный, крѣпкій, головная боль, жаръ, печистый языкъ, запоръ на кишѣ. Назначено кровопусканіе \S xxiv., haust. emeticus.; потомъ salom. gr. iv.; pulv. jalap com. \S i; слабая діета.

28. Головная боль легче; рвотное оказало свое дѣйствіе, слабilo на кишѣ два раза, сонъ хорошъ и больной чувствуетъ себѣ лучше. Пульсъ 78, кожа мягка, языкъ бѣлый, жажда. Назначена mist. sennae \S jv. и пилюли ex sulph. bebeerini. gr. v. cum extr. gentian. каждые четыре часа.

29. Лихорадки не было, испраженія свободны, пульсъ спокойный, кожа мягка, языкъ чистъ, аппетитъ хорошъ. Лекарства тѣ же; діета слабая.

30. Больной совершенно выздоровѣлъ.

Febris intermittens quot. John Jerrold, рядовой,

23 лѣтъ, темперамента сангвиническаго, работникомъ въ Индіи три года и три мѣсяца.

29-го Ноября 1843, въ 3 часа по-полудни почувствовалъ дрожь и жаръ, продолжавшіеся попеременно въ продолженіи почти трехъ часовъ, безъ всякой причины; пульсъ правильный; кожа мягкая, языкъ бѣловатъ; подобные признаки болѣзни были у него въ прошломъ мѣсяцѣ. Назначенъ: *haust. emeticus*; потомъ *calomel gr. v. s. pulv jalap. com. ʒj.* и позная ванна.

30. Рвотное и слабительное дѣйствовали, какъ слѣдуетъ; больной спалъ крѣпко, лихорадки нѣтъ; пульсъ 76; кожа мягка; языкъ очищается. Назначено *sulph. bebeerini gr. v.* каждые 4 часа и, смотря по надобности, *mist. diaphor.*; діета слабая.

Декабря 1. Пароксизма не было, испражненія свободны, спалъ хорошо. Лекарства тѣ же.

2. Пароксизма не было, испражненія свободны, спалъ спокойно, языкъ чистъ, пульсъ правильный, кожа влажна, аппетитъ поправился. Лекарство по прежнему.

3. Лихорадки нѣтъ, испражненія свободны, языкъ чистъ, аппетитъ хорошъ. Бебпринъ оставленъ и назначено *infus. Gentian. ʒiij, ter de die.*

4. Больной поправляется, лекарство то же.

5. Больной изъ госпиталя выпущенъ.

Febris intermittens quot. James M'Chrink, рядовой, 28 лѣтъ, флегматическаго темперамента, корабельный кузнецъ, въ Индіи три года и три мѣсяца. 22-го Ноября 1843, поступилъ въ 6 часовъ по-полудни съ блѣднымъ, изнуреннымъ видомъ; около 10 часовъ утромъ онъ имѣлъ сильный лихорадочный пароксизмъ. Полтора года назадъ, по его словамъ, онъ страдалъ перемежающеюся лихорадкою, которая прошла послѣ употребленія рвотныхъ, слабительныхъ и пиявицъ къ вскрытию.

Ему давали по 15 gr. sulph. bebeserini въ пилюляхъ, ежедневно, до 25-го Ноября; но послѣ того воспаленіе въ печени помѣшало въ теченіи трехъ дней употребленію этого средства.

28 Ноября лихорадка возвратилась безъ озноба и опять 29-го.

Десны и полость рта сдѣлались чувствительны отъ принятыхъ средствъ противъ воспаленія печени. Бебиринъ онъ продолжалъ до 8 Декабря, потомъ выпущенъ изъ госпиталя, и съ тѣхъ поръ лихорадка не возвращалась.

Febris cont. Joshua Richards, рядовой, 24 лѣтъ, темперамента сангвиническаго, сапожникъ,

въ Индіи 4 годъ. 29-го Ноября 1843, поступилъ въ госпиталь въ 6 часовъ утра; вечеромъ на канунѣ почувствовалъ ознобъ, за нимъ головную боль, жаръ и жажду. Ему назначено по 15 gr. sulph. bebeerini въ день. 11 числа лихорадка возвращалась съ приливомъ къ головѣ, и потомъ опять 12-го числа. Этотъ приемъ безпринна онъ получалъ ежедневно въ то время, когда лихорадочные припадки утихали; 10 дней не возвращалась лихорадка. По возвращеніи къ занятіямъ она опять появилась, но какъ все количество безпринна было израсходовано, то припущены были замѣнить ею хининомъ.

Ни въ одномъ изъ этихъ случаевъ безпринъ не причинилъ шума въ ушахъ.

Kamptec, 19-го Генваря 1844 года.

Подписано: J. Dempster M. D. врачъ Н. М.
21-го Фузплировъ.

Отзывъ J. Douglass'a, врача 13-го пѣхотнаго полка, къ Г. Секретарю Медицинскаго Совѣта въ Мадрасъ.

Употребивъ небольшое количество sulphatis bebeerini, присланное мнѣ для испытанія, въ лихо-

радкахъ мѣзматическаго происхожденія, я представляю краткій отчетъ тѣхъ случаевъ, гдѣ онъ былъ употребленъ.

Должно замѣтить: 1) что хотя бебиринъ болѣзные приипмалъ во время самой лихорадки, въ одномъ только случаѣ обнаружилсь головные припадки, и то на короткое время; 2) что онъ возбуждаетъ испарину, успокоиваетъ лихорадку и останавливаетъ лихорадочныя движенія (exacerbationes); 3) что онъ оказываетъ, по видимому, особенное вліяніе на кишечныя испражнения, перемѣняя ихъ въ кирпично-красный цвѣтъ. Впрочемъ цвѣтъ этотъ въ испражненіяхъ не рѣдко бываетъ при лихорадкахъ послабляющихъ, потому нельзя на вѣрное утверждать, что онъ зависитъ отъ бебирина.

Не смотря на ограниченное число опытовъ, я совершенно убѣжденъ, что бебиринъ составляетъ превосходное лекарство въ перемѣжающихся лихорадкахъ и совершенно можетъ замѣнить хининъ.

Febris remittens. Veerasaamy, 24 лѣтъ, Сероу, принадлежащій компаніи, худошаваго тѣлосложенія, 12-го Декабря 1843 поступилъ въ госпиталь въ 6 часовъ утра, съ лихорадкою, кото-

рою боленъ два дня, съ частыми ознобами, головокруженіемъ и большой слабостью, кожа горячая, пульсъ скорый, глаза красныя, языкъ красный. Назначено внутрь: pulv. r. іресас. ℥j tartarat. stibii et potas. gr. j. M. f. pulv.; потомъ pulv. jalap. comp. ℥j.

13. Вечера послѣ дѣйствія лекарства лихорадка была легче, но къ ночи сильный лихорадочный пароксизмъ, съ бредомъ послѣ озноба; кожа суха и горяча, пульсъ скорый, большая жажда, болѣе нигдѣ не чувствуетъ, понятія ясныя. Внутрь данъ порошокъ ялупы съ каломелемъ.

Rp. Liq. ammoniae. acet. ℥j.

tartarat. stibii et potass gr. ij;

mixture camph. ℥iij. M.

приимать по ℥j каждые три часа.

14. По временамъ ознобъ, лихорадка и тихій бредъ ночью. Вчера сильно ослабло на нощъ; головные и лихорадочные припадки усиливаются. Назначено приимать сѣрноокислый хининъ, каждый часъ по два грана.

15. Спаль спокойнѣе, безъ бреда; сухость и жаръ кожи продолжаются, съ ознобомъ; значительная слабость. Хининую соль назначено продолжать.

16. Ночью сильный лихорадочный пароксизмъ, съ бредомъ, который еще и утромъ продолжался, когда больной одинъ; жалуется на дрожь, кожа суха и горяча, губы сухія, языкъ сухъ, испражненія свободны. Назначена испанская мушка на затылокъ и внутрь бебирина по 10 гранъ утромъ и послѣ обѣда.

17. Лихорадка легче. Чрезъ три часа послѣ перваго приѣма бебирина, который сильное оказалъ вліяніе на мозгъ, наступилъ сильный припадокъ, почему второй приѣмъ не данъ. Мушка хорошо дѣйствовала, больной спокойно спалъ и всталъ веселѣе. Назначены тѣ же два приѣма бебирина.

18. Лихорадки не было болѣе; кожа еще суха и горячка, съ чувствомъ озноба. Больной принялъ вчера оба приѣма бебирина, которые вызвали испарину; бреда не было. Назначены тѣ же приѣмы бебирина.

19. Кожа въ первый разъ влажна и мягка; больной имѣлъ обильное испражненіе ночью. Назначены тѣ же приѣмы бебирина.

20. Лихорадки не было; бебиринъ назначенъ по два грана утромъ и вечеромъ.

21. Жалуется на слабость; бебиринъ оставленъ.

27. Большой выздоровѣлъ и выпущенъ изъ госпиталѣ.

Febris remittens. Soobroyah, 34 лѣтъ, Сероу компанейской No. 322, слабый и истощенный. Поступилъ 22-го Декабря 1843, въ 7 часовъ утромъ, жаловался на лихорадку въ продолженіи двухъ дней; приступы начинаются къ полдню, съ постояннымъ круженіемъ головы, кожа горяча и суха, пульсъ скорый, языкъ печистъ. Былъ въ госпиталѣ отъ 16 Ноября по 19 Декабря съ послабляющею лихорадкою и съ тѣхъ поръ еще не оправился. Назначенъ внутрь pulv. g. iressac. ʒj; потомъ pulv. jalap. comp. ʒj.

Вечеромъ лихорадка сплыѣе, съ дрожью, кожа горяча и суха; испражненія свободны. Назначено принять 3 грапа каломеля.

30. Ночь провелъ безпокойно, чувство дрожи продолжается, кожа суха и теплѣе натуральной; назначенъ бебиринъ по 5 гр. утромъ и вечеромъ.

31. Потѣлъ спльно послѣ бебирина; въ 2 ч. по-полудни была лихорадка, съ головокруженіемъ, ночь провелъ спокойнѣе. Лихорадочное со-

стояніе продолжается; бебиринъ назначено принимать такъ же, какъ и вчера.

Генв. 1. Лихорадка прекратилась ночью; кожа прохладна, чувствуетъ ознобъ; имѣлъ нѣсколько кирпично-красныхъ испражнений. Бебиринъ назначенъ по прежнему.

2. Имѣлъ лихорадку, начавшуюся ознобомъ, отъ 3 часовъ до 6 утра. Приемы бебирина назначены тѣ же.

3. Ни лихорадки, ни дрожи; бебиринъ назначено продолжать.

4. Лихорадки не было, чувствуетъ себя бодрѣе и лучше, бебиринъ продолжается.

6. Больной поправляется, бебиринъ оставленъ.

11. Выздоровѣлъ и выпущенъ изъ госпиталя.

Febris intermittens quot. Rammonah, 50 лѣтъ, Сыроу компанейской No. 284. 23-го Марта 1844, поступилъ въ госпиталь въ 7 часовъ утра; страдаетъ ежедневною лихорадкой въ продолженіи двухъ дней, отъ полдня до вечера; пульсъ скорый; кожа сухая; языкъ бѣлый. Назначено: pulv. ipecac. ℥j, cum tartar. stibii et potass. gr. j; потомъ pulv. jalap. comp. ℥j.

24. Лекарство произвело свое дѣйствіе; лихорадка возвратилась вечеромъ; больной пришелъ

вечеромъ пплюин пзъ каломеля; ночь провелъ въ жару, безпокойно; кожа влажная, но температура увеличена; жажда. Назначено pulv. jalap. comp. ℥j; et mist. salin. ℥j. каждые два часа.

25. Къ почп лпхорадка, безъ озноба, жалуется на сильный жаръ по всему тѣлу, пульсъ скорый, кожа сухая. Лекарства тѣ же.

26. Лпхорадка во всю почъ, но не такъ сильная; пспражненія свободныя. Назначенъ бебпрппъ по 5 гр. каждые три часа.

27-го. Лпхорадки не было; вчера прппаты двадцать гранъ бебприна.

28-го. Лпхорадки нѣтъ; бебпрппъ продолжается.

29-го. Одна слабость; бебпрппъ оставленъ.

Апрѣля 5-го выпущенъ здоровымъ.

Пять случаевъ употребленія sulphatis bebeerini противъ перелижающихся лихорадокъ въ госпитали 3-го баталіона артиллеріи въ Kamptée.

Febris intermit. quot. T. G. Doyle, бомбардиръ, 30 лѣтъ, 10 лѣтъ въ Индіи, перваго темперамента, поступилъ въ 6 ч. утра 26-го Ноября 1843 года; худощавъ, трезваго поведенія. Возвратился утромъ пзъ Nagpore, гдѣ онъ былъ

на службѣ послѣднія двѣ подѣлы. По словамъ его, въ послѣдніе девять дней ежедневно имѣлъ лихорадочный пароксизмъ, который начинался въ 9 часовъ утра и оканчивался въ 3 или 4 часа по полудни, безъ дрожи. Припадки были; головная боль, жаръ, жажда, тошнота, послѣ того обильный потъ; испражнения свободны, языкъ бѣлый. Въ госпитали найдена кожа обыкновенной температуры, пульсъ натуральный, но больной жаловался на головную боль, которая не оставляетъ его и во время перемѣжекъ. Лекарствъ никакихъ не принималъ съ самаго начала болѣзни. Назначено olei ricini $\bar{5}$ j и слабая діета.

5 Часовъ по полудни. Лихорадка была въ 9 часовъ и еще продолжается; больной жалуется на жестокую головную боль, тошноту и жажду; кожа горяча и суха; пульсъ 104, полный, мягкій, 4 испражнения на низъ, цвѣта оранжеваго, слизистыя, съ кусками. Поставлены пиявцы, которыя хотя хорошо тянули кровь, но не облегчили головной боли. Послѣ послѣдняго пароксизма назначена по временамъ слѣдующая микстура.

Rp. Tart. stibii et potass. gj.
Magnesiae sulphat. $\bar{3}$ vj.

Acet. ammon. liq. ℥ij.

Mist. camphor. ℥viii. M.

Кромѣ того:

Rp. Colomel.; pulv. ipecac. comp. an. gr. vj;

Confect. aromat. q. s. ut ft. pil. v.

Принять къ почп.

27-го. Въ 10 часовъ вечера пароксизмъ прекратился, съ обильнымъ потомъ, и съ тѣхъ поръ головная боль уменьшалась постепенно. Кожа теперь прохладна, пульсъ 76, три испражнения темныя, слизистыя, животъ нечувствителенъ. Назначено по три грана sulphat. bebes-
cini, въ ℥j воды, въ 4, 5, 6, 7, 8 и 9 часовъ.

Вечеромъ. Принято все назначенное количество бебрина (18 гранъ), лихорадка не возвращалась; кожа прохладна, пульсъ натуральный, головная боль еще несовершенно прошла. Единственное впечатлѣніе бебрина оказалось на органы вкуса; больной чувствуетъ смѣсь изъ сладкаго и горькаго. Четыре испражнения на изъ зеленоватой слизи. Назначены слѣдующія пилюли:

Rp. Massac pil. hydrarg. gr. vj;

Pil. rhei comp. gr. x.

M. ft. pilulae jijj.

28-го. Лихорадки нѣтъ, одно испражненіе; головная боль очень незначительная; языкъ бѣлъ на середницѣ; безъ лекарствъ. Вечеромъ лихорадка не возвращалась. Три испражненія жидкія. Назначено принять вчерашнія пилюли.

29-го. Голова не болитъ, языкъ чистъ; два испражненія натуральныя; аппетитъ поправляется.

30-го. Больной поправляется.

2-го. Выпущенъ изъ госпиталя.

Febris interm. tertiana. Patrick Fitzpatrick, капоинръ 30 лѣтъ, 15 лѣтъ въ Индіи; сангвиническаго темперамента, крѣпкаго, мускулезнаго тѣлосложенія, поведенія трезваго. Поступилъ въ 11 часовъ утромъ 28-го Ноября 1843, во время озноба перемежающейся лихорадки, которая, говоритъ онъ, появилась 26-го сего мѣсяца, въ 11 же часовъ. Вскорѣ по поступленіи въ госпиталь кожа сдѣлалась горячею, пульсъ скорый. Больной жаловался на головную боль, тошноту, потерю аппетита, ломоту въ ногахъ, жажду, головокруженіе и упадокъ силъ; назначено gr. j tart. emetici и ʒj ipecac.; это произвело обиль-

ную рвоту; послѣ того прописанъ порошокъ изъ gr. vj salomel. п Эjj pulv. r. jalap. com. отъ чего четыре раза слабѣло его на нпзъ, лпхорадка стала убывать, п показался потъ. Лекарства оставлены; слабая діѣта.

29-го. Жалуется на головную боль, но не жестокою; языкъ очень мало покрытъ слпзью, влажный; пульсъ п кожа натуральны; два испражненія. Безъ лекарствъ.

30-го. Лпхорадки не было, но больной ждетъ ее сегодня, на нпзъ не было въ послѣдніе 24 часа; назначенъ haust. purgans ℥jv.

6 Часовъ по полудн. Въ половпнѣ 10-го утромъ былъ ознобъ п дрожъ; губы почти сплпнія. Послѣ 10 часовъ кожа сдѣлалась горячею п сухою, больной безпокоенъ, жажда, тошнота, п головокруженіе, пульсъ частый. Какъ лекарство, прппятое утромъ, слабѣло его нѣсколько разъ, то ничего болѣе не назначено. Въ 2 часа много потѣлъ, теперь жалуется только на головокруженіе п слабость; кожа прохладная, ппульсъ обыкновенный.

1-го Декабря. Лпхорадки нѣтъ; на нпзъ ночью не было.

Rp. Tart. stibii et potass. gr. j;

Magnesiae sulph. ℥v.;

Mist. camphorat. ℥vj. M.

три раза въ день по ℥ .

2. Отъ 4-хъ до 9-ти часовъ утра больной принималъ по gr. iij sulphatis bebeerini каждый часъ, въ ℥j воды.

Вечеромъ. Лихорадки не было; безъ лекарствъ.

3. Безъ лихорадки, испражненія на низъ не было; данъ pulv. jalap. comp. ℥j.

4. Выздоровѣлъ и выпущенъ изъ госпиталѣ.

Febris interm. tertiana. Charles Lowther, бомбардиръ, 29 лѣтъ, шесть лѣтъ и три мѣсяца въ Индіи; сангвиническаго темперамента, крѣпкаго тѣлосложенія, поведенія трезваго. Принятъ въ госпиталь 31 Марта 1844, въ 4 часа по-полудни, во время лихорадочнаго жару; жалуется на головную боль, жажду, потерю аппетита и слабость; пульсъ 108, полный; языкъ бѣлый; запоръ на низъ. По рассказамъ больного, лихорадка была 27 и 29-го этого мѣсяца, каждый разъ въ 2 часа по-полудни и оканчивалась обильнымъ потомъ въ пять часовъ вечера. Назначенъ порошокъ изъ gr. j. tart. emetic. et ℥j jresac.; послѣ—gr. iv. colomel. и gr. 50 pulv. jalap. comp.

1-го Апрѣля. Послѣ дѣйствія рвотнаго показался обильный потъ, съ облегченіемъ всѣхъ припадковъ, два испражненія на нпзъ послѣ слабительнаго, больной чувствуетъ себя лучше, пульсъ натуральный; остался безъ лекарствъ.

2. Лихорадка не возвращалась, по утрумъ жаловался на головную боль; на нпзъ не было послѣ вечера 31-го Марта. *Haust. purgant. ꝑiv.*

5 часовъ вечера. Тотчасъ послѣ утренняя потрѣщенія началась лихорадка ознобомъ. Головная боль жестокая; нѣсколько обильныхъ испражнений.

Rp. Tart. stibii et potass. gr. j

Solve in aq. ꝑvj;

по ꝑjβ каждый часъ; къ вскамъ 16 півовъ.

3. Въ половинѣ шестаго часа лихорадка кончилась обильнымъ потомъ; головная боль послѣ півовъ прошла; больной спалъ покойно; утрумъ кара не было, языкъ чистъ; испражненія свободны; безъ лекарствъ.

Вечеромъ. Послѣ полудня головная боль безъ кару и безъ лихорадочныхъ припадковъ; испражненія не было.

Rp. Calomelanos gr. jv;

Extr. colocynth. c. gr. vj;

M. ft. pilulae ij;

принять въ разъ и къ вискамъ 12 піявиць.

4. Лихорадки не было; послѣ піявиць голова не болитъ; одно испражненіе; больной принялъ по gr. j. sulph. bebesini въ $\bar{5}$ j воды въ пять, шесть, семь, восемь, девять и десять часовъ.

6 часовъ вечеромъ. Послѣ бебирна (18 gr.) лихорадка возвратилась въ 11 часовъ. Ознобъ былъ незначительный; къ 3 часамъ показался потъ; кожа прохладна и влажна, жалуется, только на голову; испражненія не было. Лихорадка была гораздо легче; еще назначены 12 піявиць къ вискамъ и прежнія пилюли.

5. Головная боль опять прошла, жалуется только на слабость; языкъ немного бѣлъ; нѣсколько испражнений со слизью; безъ лекарствъ.

6. Лихорадки нѣтъ; одно испражненіе, немного слизи; пульсъ 84; бебирна снова данъ въ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 часовъ, и въ полдень — olei ricini $\bar{5}$ j.

7. Лихорадки не было; больной принялъ 24 грана бебирна, безъ всякаго отъ того послѣдствія на мозгъ и на сосуды; пульсъ 80; испражненія свободны; оставленъ безъ лекарствъ.

8. Лихорадки нѣтъ.

11. Выздоровѣлъ и выпущенъ изъ госпиталя.

Febris interm. quotidiana. Daniel Murphy, канониръ, 30 лѣтъ, пять лѣтъ въ Индіи, темперамента сангвиническаго, крѣпкаго тѣлосложенія, поведенія трезваго. Поступилъ въ 6 часовъ утра 13 Мая 1844 въ госпиталь, съ потерей аппетита, головою болью, головокруженіемъ, жаждою; языкъ бѣлый, влажный; кожа прохладная, пульсъ обыкновенный, испраженія свободныя, 10, 11 и 12-го числа имѣлъ пароксизмъ перемежающейся лихорадки, съ 3 часовъ пополудни, сперва ознобомъ, за нимъ жаръ и головная боль и наконецъ потъ въ 6 часовъ вечера; причины болѣзни не знаетъ.

Rp. Tartari emetici gr. j;

pulv r. iresacuanhæ ℥j. M. на приемъ.

Вечеромъ. Рвотное дѣйствовало хорошо; пароксизмъ возвратился сегодня въ десять часовъ. Озноба не было, но лице сдѣлалось краснымъ; головная боль жестокая; больной жалуется на боль въ спинѣ и нижнихъ конечностяхъ, жажда, тошнота и большой упадокъ силъ; кожа горячая и сухая; пульсъ 104, полный; принималъ нѣ-

сколько разъ слѣдующую микстуру, которая тошнила, но не слабила на низъ.

Rp. Mist. camphor. ℥jx;
tartari emetici gr. jβ;
magnes. sulph. ℥vj. M.

Назначенъ порошокъ:

Rp. Calomelani, gr. vj;
pulv. r. jalapae comp. Эij. M. на приемъ.

14. Потъ начался въ 6 часовъ по-полудни; сегодня утромъ температура обыкновенная, чувствуетъ небольшую головную боль, пульсъ 78, мягкій, испражненія были при помощи промывательнаго. Назначено принимать по gr. iij sulph. bebeerini въ ℥j воды въ 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 часовъ.

Вечеромъ, отъ 21 грана sulph. bebeerini, не чувствовалъ никакихъ припадковъ головныхъ, даже пульсъ не измѣнился. Лихорадка возвратилась въ 3 часа по-полудни, но въ слабой степени. Теперь больной потѣетъ; испражненія на низъ не было; потъ былъ весьма обильный во время пріятія бебирива, но это должно приписать нѣсколько жаркой погодѣ. Назначено внутрь:

Rp. Massae pil. hydrarg. gr. vj;
r. ipecacuanhæ gr. ij.

M. ft. pilulae ij; sr.

на приемъ.

15. Спаль превосходно; пульсъ 78; кожа влажная, холодная, приемы безпрерывна тѣ же, какъ вчера.

6 часовъ вечера. Лихорадка возвратилась въ полдень; головная боль была сильнѣе, чѣмъ въ первыхъ пароксизмахъ; во время жара пульсъ 110, лицо красное; глаза налитые кровью; испарина началась; на языкъ слабо; назначено принять прежнія пилюли.

16. Лихорадка прекратилась, какъ и прежде, обильнымъ потомъ; пульсъ 84; языкъ покрытъ бѣлой корою, влажный, одно испражненіе. Назначено принимать по три грана sulph. chinini въ 3j воды, въ тѣ же часы, какъ прежде безпрерывно.

6 часовъ вечера. Приняты 21 gr. хинина, лихорадка не возвращалась; большой слабъ, но спокоенъ; два испражненія на языкъ; остался безъ лекарствъ.

17. Ночь провелъ хорошо; пульсъ 80; лихорадочныхъ припадковъ не было.

18. Больной поправляется; появился аппетитъ; испражненія свободны.

24. Больной выпущенъ изъ госпиталя.

Febris interm. tertiana. М-е Анна Dogherty, 28 лѣтъ, пять лѣтъ въ Индіи, слабаго тѣлосложенія. Принята въ госпиталь въ 6 часовъ пополудни 10-го Мая 1844 года, во время жара, въ пароксизмѣ перемежающейся лихорадки, которая началась ознобомъ за часъ до вступленія въ госпиталь. Больная жалуется на жестокую боль въ головѣ, въ спинѣ и въ нижнихъ конечностяхъ, жажду, тошноту, потерю аппетита. Кожа суха и горяча; пульсъ 106, полный, но не твердъ; языкъ покрытъ толстою корою, но влажный; испражненія свободны.

По ея словамъ, она имѣла лихорадку 6-го и 8-го числа, которая начиналась въ 4 часа пополудни и продолжалась нѣсколько часовъ. Причина болѣзни не извѣстна.

Rp. Tart. emetici gr. j;
pulv. r. ipecac. ℞j. M.

на приемъ.

Rp. Calomelis gr. v.;
pulv. r. Jalap. comp. ℞j. M.

принять, спустя три часа.

11. Рвотное вызвало потъ, и большое количество зеленоватой жидкости; слабительное хо-

рошо дѣйствовало; головная боль, жажда и слабость, кожа прохладна, пульсъ 84, мягкій, языкъ чистый.

Rp. Tartari emetici gr j;
magnesiae sulph. \mathfrak{z} j.
aq. \mathfrak{z} viiij. M.

принять три раза въ день по \mathfrak{z} j β .

12. Вчера не было лихорадки; чувствуетъ слабость, круженіе головы, когда садится въ постели, въ другихъ отношеніяхъ здорова, испражненія свободны. Въ 6 часовъ утра пароксизмъ возвратился въ 1 часъ, послѣ озноба былъ жаръ и потъ; послѣдній начался въ 5 $\frac{1}{2}$ часовъ; при этомъ головная боль, пульсъ скорый, лицо красное и сильная жажда; приняла нѣсколько приѣмовъ микстуры, которая произвела рвоту и поносъ; испражненія водянисты, къ вѣскамъ 16 пиявицъ.

13. Головная боль послѣ пиявицъ прекратилась; но больная очень слаба и едва можетъ стоять на ногахъ отъ головокруженія.

14. Сегодня слѣдуетъ быть лихорадкѣ; испражненіе одно; пульсъ 64; назначены gr. jiiij sulphat. bebeserini въ \mathfrak{z} j воды въ 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 часовъ.

Въ 6 часовъ утромъ. Больная приняла 21 гр.

бепирна, послѣдній пріемъ въ 11 часовъ, но лихорадка возвратилась въ полдень; озноба не было; кожа вдругъ сдѣлалась горячею и сухою. Она жаловалась на головную боль, жажду, была безпокойна, на нѣзъ утромъ не было, почему дана $\bar{3}j$ olei cinini во время пароксизма. Послѣдній пароксизмъ, какъ полагаетъ больная, слабѣе другихъ; головная боль продолжается; начала потѣть въ 5 часовъ; пульсъ 98; масло еще не оказало дѣйствія. Назначено опять 14 пиявицъ къ вѣскамъ.

Rp. Massae pil. hydrarg. gr. vj;
pulv. ipecac. gr. jj. m.
fiat pilulae ij; sr.

на пріемъ.

15. Головная боль отъ пиявицъ легче; жалуется больная только на слабость; было нѣсколько испражнений. Пиявицъ назначено повторить.

16. День лихорадочный; больная слаба, не имѣетъ аппетита; испраженія свободны; 3 гр. sulphatis cinini въ $\bar{3}j$ воды назначено принимать въ тѣ самые часы, какъ бепирна.

6 часовъ утра. Имѣла слабый пароксизмъ лихорадки отъ 4-хъ до 5-ти часовъ; языкъ бѣлый, по

влажный; слабая глухота отъ хинина, но безъ головной боли; пульсъ 96.

17. Языкъ чистый, жажда, кожа прохладна, на языкъ не было съ вчерашняго утра; дано colici ricini ʒj.

18. Масло подѣйствовало нѣсколько разъ, языкъ чистъ, хининъ назначенъ также, какъ и прежде.

19. Вчера не было ни малѣйшаго признака лихорадки; больная слаба, но появился аппетитъ; испражненія свободны.

20. Лихорадка не возвращалась; больная поправляется.

24. Выпущена совершенно здоровою.

Прилигание. Эти пять случаевъ, по наблюденіямъ въ госпиталѣ, были простыя, перемежающіяся лихорадки, и потому самые приличныя для испытанія противулихорадочной силы сѣрно-кислаго бебрина. Во всѣхъ этихъ случаяхъ сначала отравленія желудка и кишекъ были приведены въ надлежащій порядокъ рвотными и легкими ртутными слабительными, и какъ время пароксизмовъ было извѣстно, то sulph. bebesicini назначалось по три грана каждый часъ, пока больной не принялъ отъ 18 до

24 гранъ , при томъ такъ , чтобы послѣдній пріемъ былъ припятъ тотчасъ передъ пароксизмомъ. Въ двухъ случаяхъ , гдѣ бебиринъ не остановилъ лихорадки , онъ замѣненъ сѣрниокислымъ хининомъ , для сравненія дѣйствія двухъ этихъ лекарствъ.

Въ первыхъ двухъ случаяхъ 18 гранъ *sulph. bebescini* остановили лихорадочный пароксизмъ; въ третьемъ хотя то же количество не оказало такого дѣйствія , однакожъ послѣдующіе пароксизмы являлись позже и были слабѣе , и отъ пріема вновь 24 гранъ бебирина совершенно прекратились. Въ этихъ трехъ случаяхъ противулихорадочное дѣйствіе бебирина было точно такое , какъ и сѣрниокислаго хинина.

Въ четвертомъ случаѣ , 21 гранъ бебирина были недостаточны для прекращенія пароксизма , который впрочемъ былъ слабъ и оказался позже. То же самое количество бебирина было повторено передъ слѣдующимъ пароксизмомъ , но противъ ожиданія , онъ возвратился раньше и сильнѣе прежнихъ ; послѣ чего бебиринъ замѣненъ хининомъ , котораго 21 гранъ совершенно прекратил лихорадку.

Женщинѣ *Dogherty* 21 гранъ *sulphatis bebes-*

гипі даны безъ видимаго вліянія на лихорадку; такое же количество хинина, данное послѣ, должно было повторить для прекращенія лихорадки.

Изъ этихъ случаевъ впрочемъ можно заключить, что безирритъ имѣетъ значительную противулихорадочную силу, и хотя уступаетъ хинину, но можетъ замѣнять его во многихъ случаяхъ; и что онъ не возбуждалъ ни кровопосной системы, ни мозга.

Kamptee, 24-го Мая 1844 года.

Подписано: J. Anderson M. D. м. врачъ.
D. Falconer, исправляющій должность старшаго врача.

Слѣдующій примѣръ, гдѣ безирритъ былъ испытанъ при сильномъ разстройствѣ организма отъ продолжительной, перемежающейся лихорадки, доставленъ Dr. Bennett'омъ.

Bronchitis, febris intermittens quartana въ продолженіи 32 лѣтъ, *cum hypertrophia et induratione lienis*. — Alexander Murray, 56 лѣтъ, принятъ въ госпиталь 21-го Ноября 1844, жаловался на одышку и кашель, съ изверженіемъ большаго количества мокроты. При удареніи (*percussio*) въ грудь, звукъ ясный на обѣихъ

сторонахъ, ясный дыхательный шумъ слышенъ по всей передней части груди. На бокахъ и на спинѣ, подъ конецъ каждого выдыханія, слышенъ слабый, мокротный шумъ; при кашлѣ обильная слизисто-гнойная мокрота, кусками; очень трудное дыханіе; спать можетъ только въ полусидячемъ положеніи; одышка періодическая усиливается движеніемъ и холоднымъ вѣтромъ.

Sonus cardiacus занимаетъ два съ половиною дюйма въ поперечникѣ. Звукъ сердца ясно слышны около двухъ дюймовъ ниже лѣваго соска. Въ этомъ мѣстѣ больной чувствуетъ боль, которая увеличивается отъ движенія. Легкій шумъ (*murmur*) при второмъ звукѣ сердца; пульсъ 52 и довольно крѣпкій.

При ударахъ подъ ложечкой значительный глухой звукъ, который отзывается тотчасъ подъ ложными ребрами, болѣе къ наружи и ниже положенія сердца, и продолжается до $4\frac{1}{2}$ дюймовъ внизъ и около 3 дюймовъ взадъ. Когда больного спросили, страдалъ ли онъ когда нибудь перемежающеюся лихорадкою, оказалось, что онъ страдаетъ ею тридцать два года. Онъ получилъ ее въ Мадрасѣ, гдѣ болѣзнь эта мучила его семь мѣсяцевъ безъ перемежки; съ тѣхъ поръ она

его не оставляла. Жалуются на головную боль, мушки предъ глазами, круженіе головы и боль между лопатокъ. Языкъ печистый, аппетитъ хорошъ, жажда, испражненія вчера были пять разъ отъ лекарства. Видъ и цвѣтъ лица показываютъ обыкновенное истощеніе отъ продолжительной лихорадки.

Rp. Tartari emetici gr. j;

Spir. nitr. dulcis ℥is;

Mist. scillae ℥vij;

Solutionis mur. morph. ℥ij. M.

принимать по $\frac{1}{2}$ каждые 4 часа.

Ноября 22-го. Ночь провелъ безъ сна отъ частыхъ припадковъ удушья и кашля; мокрота окрашена кровью; хрипы по всей груди; жалуются на сильную головную боль и круженіе. Изъ правой половины груди назначено вытянуть кровь кровососными банками.

26. Чувствуетъ большое облегченіе отъ кровопусканія; дыханіе гораздо свободнѣе, мокрота съ кровяными полосками.

3-го Декабря. Припадки воспаленія дыхательнаго горла почти исчезли. Въ прошлую ночь имѣлъ пароксизмъ перемежающейся лихорадки;

по словамъ больного, она возвращается каждую третью ночь.

5. *Rp. Sulph. chinini 3j;*

Pulv. capsici gr. jx. M.

раздѣлить на три части и принять черезъ четыре часа.

6. Принявъ всѣ три порошка вчера до лихорадки, пароксизмъ былъ слабѣе предыдущихъ.

8. Повторить порошокъ.

9. Пароксизмъ ночью, не смотря на порошокъ, былъ гораздо сильнѣе, чѣмъ 6-го числа. Головная боль, краснота глазъ, кажется, отъ сѣрно-кислаго хинина.

12. Въ прошлую ночь другой пароксизмъ, очень жестокий. Порошки хинина нарочно были оставлены, чтобъ сравнить продолжительность и силу пароксизма. Холодъ съ дрожью продолжался три четверти часа, потъ обильный и продолжался два или три часа:

Rp. Bebeerini sulph. gr. v.;

Pulv. capsici gr. iij

M. ft. pulv. mitte tales vj; sr.

три раза въ день по порошокъ.

15. Пароксизмъ былъ ночью и продолжался

также, какъ и послѣдній; дрожь не такъ жестокая и потъ не такъ обильный.

23. *Rp. Bebeerini sulph. ʒj;*

Pulv. capsici, gr. jx.

M. ft. pulv. d. tales iij.

Принимать каждые четыре часа по порошокъ.

24. Въ прошлую ночь во время пароксизма ознобъ продолжался 20 минутъ.

27. Назначены порошокъ изъ бебирина, по пяти гранъ каждый, три раза въ день, во время перемежки, и три порошка по ʒj въ день самого пароксизма. Прошедшую ночь ознобъ продолжался 20 минутъ и не такъ былъ жестокъ; головная боль.

30. Въ прошлую ночь ознобъ длился 16 минутъ, потъ былъ умеренный; головная боль.

Генваря 2-го. Въ прошлую ночь ознобъ длился 15 минутъ и былъ гораздо слабѣе прежняго; головная боль слабѣе, значительная краснота глазъ и головокруженіе. Назначено принимать *Pil. col. com. ij*, и на утро *haust. cath. ʒiv.*

5. Въ прошедшую ночь ознобъ продолжался 13 минутъ; головная боль значительно меньше. Бебиринъ, назначенный въ день пароксизма, уменьшенъ по 10 гр. въ каждомъ порошокѣ.

8. Ознобъ въ прошлую ночь продолжался 10 минутъ и очень слабый.

Больному позволено было выйти изъ госпиталя, для полученія пансіона; онъ возвратился въ 12 часу ночью, пьяный и въ такомъ видѣ, что нужно было отправить его въ полицію; послѣ чего объ немъ не было никакихъ извѣстій.

Прилѣжаніе. Человѣкъ этотъ поступилъ въ госпиталь *cum asthmate et bronchitide*. Легочные припадки уступили *expectorantibus*, вмѣстѣ *cum antispasmodicis*, и мѣстнымъ кровопусканіямъ. Странно, что хотя онъ страдалъ жестокою перемежающеюся лихорадкою, но не жаловался на нее. Отвердѣніе и опухоль селезенки были поводомъ къ открытію ея. Когда воспаленіе горла и удушье миновались, начали лечить лихорадку большими приемами хинина, который хотя и оказалъ слабое дѣйствіе на жестокость и продолжительность перваго пароксизма, но не оказалъ никакого дѣйствія на второй пароксизмъ. При каждомъ разѣ 3j хинина и 9 gr. *pulv. capsici* приняты были, въ теченіи 12 часовъ. Тогда рѣшились испытать безпринъ, но прежде выжидали день пароксизма, не давая никакого лекарства. При этомъ случаѣ ознобъ былъ весьма

иленъ и продолжался три четверти часа; жаръ и потъ длился отъ двухъ до трехъ часовъ. 5 gr. безприпа назначено во время промежутковъ, въ три приема, и по 3j на третій день, когда ожидали пароксизма. Первый пароксизмъ, послѣ этого леченія, былъ одинаковъ съ прежними касательно времени, но слабѣе въ степени. Во второмъ пароксизмѣ ознобъ, вмѣсто 45 минутъ, продолжался только 25 минутъ; въ третьемъ только 20 минутъ; въ четвертомъ 16; въ пятомъ 15; въ шестомъ 13; въ седьмомъ 8 минутъ. Послѣ сего онъ оставилъ госпиталь и болѣе не возвращался; къ сожалѣнію состояніе селезенки не было изслѣдовано до его ухода.

Дѣйствіе этого лекарства, казалось, во всѣхъ отношеніяхъ было сходно съ дѣйствіемъ хинина. Относительную силу каждаго конечно можно опредѣлить только болѣе обширными наблюденіями. Но въ разсужденіи дѣйствія противуположнаго и возбуждающаго опи, кажется мнѣ, одинаковы; приливъ къ головному мозгу одинаковый замѣченъ былъ въ выше описанномъ случаѣ, послѣ принятія внутрь 3j того и другаго средства, и, сколько я могъ замѣтить о терапевтическихъ его дѣйствіяхъ въ этомъ случаѣ, все

убѣждаетъ меня, что дѣйствія бебиррина такія же точно, какъ и хинина, если даже не въ высшей степени.

J. H. Bennett. M. D.

Число лихорадокъ, лечимыхъ бебирриномъ, мнѣ извѣстныхъ, простирается до 40; онѣ все помѣщены въ прилагаемой таблицѣ. Изъ нея можно видѣть, что бебирринъ былъ испытанъ въ разныхъ климатахъ, включая Единбургъ, Канаду, Западную и Восточную Индію, во всѣхъ различныхъ видахъ послабляющей и перемежающейся лихорадки и во всѣхъ возрастахъ, отъ 12 до 74 лѣтъ. Во всѣхъ сихъ случаяхъ бебирринъ оказывалъ болѣе или менѣе противулихорадочное дѣйствіе (*virtus antiperiodica*). Въ 6-ти случаяхъ, или почти въ одномъ изъ семъ, по видимому, онъ дѣйствовалъ неудовлетворительно. Изъ 26 случаевъ, описанныхъ подробно, только въ 5 замѣчены были нѣкоторыя непріятныя слѣдствія, но и то не болѣе, какъ незначительный шумъ въ ушахъ. Слѣдовательно, кажется, бебирринъ заслуживаетъ испытанія, въ особенности въ большихъ госпиталяхъ, гдѣ только можно найти подлежащіе случаи и совершенно

наблюдать за ними, и едѣ дешевизна его, въ сравненіи съ хининомъ, также достойна вниманія.

Профессоръ Simpson въ Единбургѣ, сдѣлавъ довольно значительное число опытовъ надъ бибирномъ, по просьбѣ моей, доставилъ мнѣ результаты своихъ наблюденій въ слѣдующемъ письмѣ, отъ 30-го Января 1845.

Милостивый Государь!

Позвольте мнѣ сообщить вамъ только общія впечатлѣнія, которыя получилъ я при опытахъ надъ бибирномъ, ибо я не имѣю времени входить въ подробности. Вамъ извѣстно, что многіе предостерегаютъ акушеровъ отъ употребленія хинина во время беременности, полагая, что онъ причиняетъ выкидышъ и преждевременные роды. И мышьякъ такое средство, котораго едва ли кто захочетъ дать беременной женщинѣ. Слѣдовательно мы не можемъ такимъ образомъ приступить къ употребленію двухъ превосходныхъ средствъ въ періодическихкихъ нервныхъ боляхъ, которыя впрочемъ нерѣдки во время беременности.

Въ послѣднее время я употреблялъ вашъ sulph. bebeserini въ нѣкоторыхъ случаяхъ этого рода, съ совершеннымъ и удовлетворительнымъ успѣхомъ. Я прописалъ его, около двухъ мѣсяцевъ назадъ, дамѣ, которая мучилась жестокими нервными болями въ головѣ и въ лицѣ; онѣ наступали къ полдню, больная теряла зрѣніе и въ ужасныхъ мученіяхъ оставалась довольно долго. Пользующій домашній врачъ ея ставилъ пиявцы, и проч. безъ пользы; я присовѣтовалъ бербринъ въ пилюляхъ, по 2 гр. нѣсколько разъ въ промежуткахъ между пароксизмами. Какъ лекарство это, по видимому, не оказывало никакого дѣйствія, то приемы постепенно увеличивали, и на третій день больная приняла около 33 sulph. bebeserini, въ продолженіи 14 или 16 часовъ, въ промежуткѣ между пароксизмами. Правду сказать, я уже начиналъ отчаяваться въ его дѣйствіи, и не видя конца страданіямъ больной, хотѣлъ на другой день перемѣнить его на другое лекарство, но въ этомъ не было надобности; послѣ упомянутого большаго приема слѣдующій припадокъ былъ гораздо слабѣе и дня черезъ два болѣзни совсѣмъ прошла. Больная сама,

въ послѣдствіи, при появленіи боли, прибѣгала къ
бесприпу и всегда съ отличнымъ успѣхомъ.

Въ прошломъ году я видѣлъ подобный случай
періодической первичной боли у беременной дамы.
Болѣзнь далеко не была такъ сильна, какъ въ
первомъ случаѣ, но довольно несносна. Она
прошла скоро отъ употребленія одного беспри-
пу.

Теперь у меня больная дама, которая имѣла
два выкидыша въ деревнѣ, и нынѣ страдаетъ
жестокими болями въ лицѣ, плечахъ и другихъ
частяхъ тѣла. До моего посѣщенія она употреб-
ляла guajacum, colchicum, и пр. въ томъ пред-
положеніи, что болѣзнь ревматическаго свойства.
Боли являются неправильными періодами, при
томъ она страдаетъ еще menorrhagia. Хининъ,
мышьякъ и другія средства не принесли ника-
кой пользы. Я наконецъ прибѣгнулъ къ сѣрно-
кислому бесприпу и, въ послѣднемъ моемъ посѣ-
щеніи, она рѣшительно объявила мнѣ, что ни одно
изъ прежнихъ лекарствъ не доставляло ей такого
облегченія; боли возвращаются по прежнему, но
гораздо слабѣе.

Въ прошломъ году я видѣлъ два или три при-
иѣтра, гдѣ дамы, во время выздоровленія послѣ

родовъ, имѣли слабыя періодическія припадки озноба, жара, и пр. подобно пароксизмамъ неправильной, перемежающейся лихорадки. У одной припадки были трехдневнаго типа и уступили употребленію хины; у другой, гдѣ ходъ болѣзни былъ правильный, послѣ тщетнаго употребленія хинина, мышьяка, цинка, и пр., бебиринъ, кажется, принесъ пользу больше всѣхъ другихъ средствъ и больная чувствовала себя отъ него лучше.

Обѣ эти дамы, за два года назадъ, жили въ дальнихъ странахъ, гдѣ онѣ вѣроятно получили болѣзнь отъ мѣстности.

Я имѣю другую больную изъ Шидп, гдѣ она сильно страдала отъ лихорадки, и хининъ всегда оказывалъ непріятное дѣйствіе на желудокъ. Съ пріѣзда своего въ Единбургъ она не разъ имѣла пароксизмы лихорадочныхъ припадковъ, и принимала *sulph. bebeerini*, безъ всякаго непріятнаго дѣйствія на желудокъ и безъ головной боли, которую хининъ всегда производитъ.

Во всѣхъ другихъ случаяхъ, гдѣ я употреблялъ бебиринъ, какъ противулихорадочное или укрѣпляющее средство, раздражающее и возбуж-

дающее дѣйствіе его я видѣлъ всегда гораздо слабѣе, чѣмъ отъ хинина.

Слѣдующій примѣръ доставилъ мнѣ пріятель мой, Dr. Macfarlan.

Перележающаяся нервная боль. Дама, 48 лѣтъ, 16 лѣтъ назадъ получила первую боль во лбу (*prosopalgia supra-orbitalis*) въ то время, когда она кормила пятого ребенка. Припадокъ случился въ Ноябрь, во время спальныхъ сѣверо-восточныхъ, холодныхъ вѣтровъ. Страданія были весьма жестоки и продолжались обыкновенно два часа, начиная съ четырехъ или пяти часовъ по-полудни; боли эти продолжались только двѣ недѣли и, какъ казалось, прошли отъ употребленія *linct. chinini Houxhami* и питательной пищи. Болѣзнь возвратилась въ Маѣ, но не въ такой жестокой степени. Въ слѣдующую весну тѣлесныя силы такъ были истощены страданіемъ, заботою и продолжительнымъ кормленіемъ грудью шестого ребенка, который также сильно истощалъ отъ кровопусканія противъ жестокаго воспаления дыхательнаго горла, что прежніе припадки явились снова въ ужасной степени; боль надъ лбомъ, раздражающая въ высшей степени; пароксизмы продолжались нѣсколько часовъ,

начинался обыкновенно ознобомъ и уменьшался постепенно отъ употребленія хинина, въ большомъ количествѣ вина, водки и животной пищи во время перемежекъ; сила пищеварительныхъ органовъ, казалось, не ослабѣвала отъ расстройства первыхъ чувствительныхъ. Пароксизмы эти возвращались почти одинаковыми явленіями каждую весну, нѣсколько лѣтъ, при наступленіи восточныхъ вѣтровъ. Перемѣна воздуха, въ защищенномъ отъ вѣтровъ мѣстѣ, въ Stirlingshire'ѣ, доставляла замѣтное облегченіе. Въ 1842 году, отъ заботъ и попеченія о дѣтяхъ, лежавшихъ въ скарлатинѣ, здоровье ея совершенно разстроилось и она сильно исхудала. Въ Мартѣ того года, и при наступленіи восточныхъ вѣтровъ въ Апрѣлѣ, болѣзнь укоренилась въ жестокой степени и продолжительнѣе обыкновеннаго. Хининъ давался былъ до 20 гр. въ день, даже до появленія тѣхъ непріятныхъ припадковъ, которые обыкновенно встрѣчаются при употребленіи хинина въ большихъ и продолжительныхъ пріемахъ, а именно: звонъ въ ушахъ, расстройство пищеварительныхъ органовъ и возбужденное состояніе всего организма. Когда больная удалялась въ Stirlingshire, то это опять

приносило замѣтное облегченіе, хотя слабость, при отъѣздѣ, была такъ велика, что врачъ боялся отпустить ее. Весна 1843 г. также припесла свои страданія отъ болѣзни и отъ принятыхъ противъ нея средствъ. Въ 1844, по совѣту Dr. MacIsagan'a, она, вмѣсто sulph. chinini, начала принимать бебиринъ, и нѣсколько недѣль принимала его въ пилюляхъ, начиная рано по утру, чтобы предупредить пароксизмъ, по три грана, повторяя его каждые два часа, а иногда черезъ часъ, пока доходила до xv гранъ въ сутки; а среднимъ числомъ въ двѣ недѣли по ix гр. въ сутки. Отъ этого леченія припадки начали постепенно уменьшаться, или по-крайней-мѣрѣ иногда не достигали до прежней степени. Изъ одного этого случая конечно не должно заключать о превосходствѣ бебирина надъ хининомъ въ подобныхъ періодическихъ болѣзняхъ; но вмѣстѣ я увѣренъ, что такое количество хинина, будучи принято внутрь, произвело бы весьма непріятныя послѣдствія на общее состояніе больной. Слѣдовательно въ этомъ случаѣ бебиринъ будетъ драгоценнымъ новымъ средствомъ во врачебной наукѣ.

Извлеченіе изъ письма Dr. Johnston'a.

Г-жа Д. въ послѣднее время часто страдала личною болью, которая продолжается по двѣ и по три недѣли. Она не можетъ принимать хинина, ибо онъ каждый разъ раздражаетъ кровеносную и нервную систему. Въ послѣднемъ приступѣ мужъ ея далъ ей безпринъ въ тѣхъ же пропорціяхъ, какъ давалъ ей хининъ; боль скоро прошла и болѣе не возвращалась. Она продолжала принимать безпринъ нѣсколько времени безъ всякихъ непріятныхъ припадковъ.

Выше описанные случаи, говорятъ Dr. MacLagan, по моему мнѣнію, служатъ отличными доказательствами пользы безприна. Относительно противуположной его силы, я ограничился свидѣтельствами другихъ, какъ онѣ были мнѣ сообщены, изложивъ описаніе этихъ случаевъ во всей подробности, чтобы всѣ могли видѣть ясно, на чемъ основываю я свое мнѣніе. Объ укрѣпляющихъ его качествахъ я вполне убѣжденъ многими опытами; но въ этомъ отношеніи его нельзя такъ скоро повѣрить, какъ въ періодическихъ болѣзняхъ.

Успѣхъ секретнаго средства, названнаго Warburg's drops (капли), въ составъ котораго, я думаю, входитъ безпринъ, не можетъ быть прене-

депъ въ доказательство пользы беприпа; ибо
изъ «Buchner's Repertorium» (vol. xxxv.
ч. 3) видно, что Buchner и Winkler от-
крыли въ этомъ средствѣ хининъ. Впрочемъ я
нахожу, что Winkler согласенъ съ моимъ мнѣ-
ніемъ въ томъ, что въ составъ его входитъ бе-
припъ.

Я прежде замѣтилъ, что беприпъ отличается
отъ хинина тѣмъ, что онъ не столько возбуж-
даетъ кровопосную и нервную систему, и это
кажется оправдывается во всѣхъ вышеприведен-
ныхъ случаяхъ, особенно въ примѣрахъ перв-
ныхъ болей. Кромѣ меня и другіе нашли его
полезнымъ во многихъ другихъ случаяхъ, гдѣ
возбуждающее дѣйствіе вредно, какъ напр. въ
чахоткѣ, въ слабомъ пищевареніи (dyspepsia
atonica).

Касательно способа употребленія беприпа, я
обыкновенно даю его въ пилюляхъ, cum conserv.
rosarum, также и въ тѣхъ же приѣмахъ, какъ
хининъ. Его можно удобно давать въ жидкомъ
видѣ, съ прибавленіемъ нѣсколькихъ капель раз-
веденной сѣрной кислоты, для совершеннаго его
растворенія.



No.	Имя.	Полъ.	Возрастъ.	Кѣмъ пользованъ.	Гдѣ.	Типъ лихор- д- кп.	Время про- долженія болѣзни.	Количество бе- бирина.	П р и м ѣ ч а н і я.
1	T. C.	M.	27	Dr. Douglas MacLagan.	Единбургъ.	Трехдневная.	5	—	Послѣ перваго приѣма вырвало.
2	J. P.	M.	25	—	—	—	..	40	Никакихъ непріятныхъ послѣдствій.
3	J. P.	M.	74	—	—	—	7	45	Тоже.
4	J. M.	Ж.	..	Dr. Watt.	Демерара.	—	Хининъ и мышьякъ употребляли безъ пользы.
5	M. de J.	Ж.	38	—	—	—	не возвр.	20	{ Былъ шумъ въ ушахъ.
6	G. J.	Ж.	21	—	—	—	4	80	
7	D. F.	M.	25	—	—	—	4	40	Сильно дѣйствовало на слухъ.
8	J. G.	M.	20	Dr. P. W. MacLagan.	Канада.	—	3	45	Никакихъ послѣдствій.
9	J. F.	M.	22	Dr. Blair.	Демерара.	Желч. горяч.	13	10 гр. на приемъ.	Больному показалось противнымъ.
10—14	Dr. Redie.	—	Хининъ былъ безуспѣшенъ.
15	J. P.	Ж.	38	Dr. Watt.	—	Ежедневная.	4	60	Безъ всякихъ худыхъ дѣйствій.
16	M. de J.	Ж.	40	—	—	Трехдневная.	3	48	— — — —
17	Julie.	M.	..	—	—	Ежедневная.	9	60	Болѣзнь съ страданіемъ селезенки; дурныхъ послѣдствій небыло.
18	J. de B.	M.	..	—	—	Трехдневная.	Исторія болѣзни неизвѣстна.
19	W. C.	M.	20	—	—	Желчная посл.	14	84	Болѣзнь возвратилась отъ погрѣшности въ діетѣ, безъ дурныхъ послѣдствій.
20	W. C.	M.	20	—	—	Ежедневная.	4	40	Никакихъ послѣдствій.
21	A. M.	M.	56	Dr. Rennett.	Единбургъ.	Трехдневная.	30	240	Головной мозгъ, казалось, страдалъ отъ большихъ приѣмовъ.
22	J. T.	M.	25	Dr. Dempster.	Индія.	Ежедневная.	5	25	Никакихъ послѣдствій.
23	J. B.	M.	21	—	—	Послабляющая.	6	45	— —
24	J. A.	M.	23	—	—	—	3	90	— —
25	J. J.	M.	23	—	—	Ежедневная.	9	120	— —
26	J. M.	M.	26	—	—	—	16	120	Болѣзнь съ воспаленіемъ печени; никакихъ дурныхъ послѣдствій.
27	J. R.	M.	24	—	—	Febr. Cont.	23	240	Небыло дурныхъ слѣдствій; по недостатку бебирина употребленъ хининъ.
28	V.	M.	24	Dr. Dorward.	—	Послабляющая.	15	80	Головная боль, бредъ во время употребленія бебирина.
29	S.	M.	34	—	—	—	13	70	Небыло дурныхъ слѣдствій.
30	B.	M.	50	—	—	Ежедневная.	6	40	— — —
31	T. G. D.	M.	30	Dr. Anderson.	—	—	6	18	— — —
32	P. F.	M.	30	—	—	Трехдневная.	7	18	— — —
33	E. L.	M.	29	—	—	—	12	42	— — —
34	D. M.	M.	30	—	—	Ежедневная.	11	42	Безъ успѣха; бебиринъ замѣнили хининомъ съ успѣхомъ.
35	A. D.	Ж.	28	—	—	Трехдневная.	14	21	— — — —
36—40	4 случая.	Dr. Godfrey.	—	Неудовлетворительно.

This should have been delivered
by Mr Goodier when in Edinburgh
but he quite forgot

Any Communication you may
please to give to Dr Brown
St Petersburg who sends this
Please direct

(Dr Brown

In his own House
Opposite the Castle &
Near the Mineral Water Garden
Petersburg Side
St Petersburg
Russia

This is published
by Dr Brown

